

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА Адвантан® –  
сокращенная версия

**Действующее вещество:** метилпреднизолона ацепонат 0.1%

**Лекарственная форма:** мазь для наружного применения, крем для наружного применения, эмульсия для наружного применения

**Фармакодинамика:** подавляет воспалительные и аллергические кожные реакции. После многократного нанесения на большие поверхности (40-60 % поверхности кожи), а также применении под окклюзионную повязку не отмечается нарушений функций надпочечников. При применении до 12 недель у взрослых и до 4 недель у детей (в том числе, раннего возраста) не было выявлено развития атрофии кожи.

**Показания к применению**

Атопический дерматит, истинная экзема, микробная экзема, аллергический и простой контактный дерматит, профессиональная экзема (для всех форм, кроме эмульсии), дисгидротическая экзема (для всех форм, кроме эмульсии).

Дополнительно для эмульсии: себорейный дерматит, фотодерматит, солнечный ожог.

**Противопоказания:** гиперчувствительность, туберкулез, сифилис и вирусные инфекции кожи, розацеа, периоральный дерматит, участки кожи с реакцией на вакцинацию, детский возраст до 4 месяцев.

**Способ применения и дозы:** 1 раз в сутки. Длительность – до 12 нед у взрослых и до 4 нед у детей.

**Побочное действие:** очень редко - местные реакции (зуд, жжение, эритема, сыпь); редко – фолликулит, гипертрихоз, периоральный дерматит, депигментация, аллергические реакции. При применении >4 недель или на площади >10% кожи, возможны атрофия, телеангиэктазии, стрии, акнеформные изменения и системные эффекты кортикостероидов.

**Особые указания:** При наличии инфекционных осложнений необходимо дополнительное специфическое лечение. Избегать попадания в глаза.

**Беременность и лактация:** Если польза превышает риск. При лактации не наносить на молочные железы.

**Лекарственные взаимодействия:** не выявлено.

**Условия отпуска из аптек:** без рецепта.