

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА Фуцидин® – сокращенная версия

Регистрационный номер: П N 011114/02 и П N 011114/03

Действующее вещество: фузидовая кислота 2%

Лекарственная форма: мазь для наружного применения, крем для наружного применения

Показания к применению

Кожные инфекции, вызванные бактериями, чувствительными к фузидовой кислоте

Противопоказания: гиперчувствительность.

Беременность и грудное вскармливание. Системное воздействие незначительно, развития нежелательных лекарственных реакций не ожидается. Применение при беременности и лактации возможно, когда польза для матери превышает возможный риск для плода и ребёнка. При лактации не рекомендуется наносить на молочные железы.

Способ применения и дозы: наружно, 3-4 раза в день; при использовании марлевых повязок кратность можно уменьшить до 1-2 раз в день. Продолжительность курса лечения – 7-14 дней.

Побочное действие: аллергические реакции, различные неприятные ощущения (раздражение, зуд и т.д.), различная сыпь, эритема, дерматит, конъюнктивит.

Особые указания: Продолжительные или частые курсы лечения увеличивают риск бактериальной резистентности и контактной сенсибилизации. С осторожностью наносить в периорбитальной области из-за риска раздражения глаз.

Условия отпуска из аптек: по рецепту.